ンタデ，ムカゴトラノオ，タカネスイバ，タカネナデシコ，センジユガンピ，タカネツメクサ，エゾフスマ，ヤマグルマ，オオレイジンソウ，ハクサンイチゲ，ミヤマハンショウヅル，コシジオウレン，ミツバオウレン，シラネアオイ，メヤマキンポウゲ，シナノキンバイ，ヒロハヘビノボラズ，ミヤマタネツケバナ，ハクセンナズナ，ホソバイワベンケイ，アラシグサ，ヒメミヤマウメバチソウ，ヤシヤビシヤク，フキユキノシタ，マルバイワシモツケ，タカネナナカマド，ノウゴイチゴ，ミヤマダイコンソウ，チングルマ，ミヤマキンバイ，ゴヨウイチゴ，コガネイチゴ，ベニバナイチゴ，マルバフユイチゴ，タカネザクラ，イワオウギ，オヤマノエンドウ，ハクサンフウロ，ガンコウラン，アカミノイヌツゲ，ヒメモチ，ホナガクマヤナギ，キバナノコマノツメ，オオバキスミレ，ミヤマツボスミレ，コアカバナ，シラネニンジン，ハクサンサイコ，イワテトウキ，イブキゼリ，ミヤマセンキユウ，オオカサモチ，ゴゼンタチバナ。〔合〕イワウメ，コメバツガザクラ，ウラシマツツジ，イワヒゲ，コシノハナヒリノキ，ミネズオウ，ツガザクラ，アオノツガザクラ，ハクサンシヤクナゲ，オオバツツジ，ミヤマホツツジ，クロウスゴ，クロマメノキ，ナンキンコザクラ，オオサクラソウ，オオツマトリソウ，イワイチヨウ，ミヤマリンドウ，ハナイカリ，トウヤクリンドウ，カリガネソウ，タテヤマウツボグサ，ホソバコゴメグサ，オオバミゾホオズキ，ハンカイシオガマ，ヨツバシオガマ，ミヤマシオガマ，オニシオガマ，ヒメクワガタ，ミヤマクワガタ，ムシトリスミレ，ハクサンオオバコ，ミヤマキヌタソウ，リンネソウ，コキンレイカ，ミヤマニガウリ，ヒメシヤジン，ミヤマシヤジン，イワギキヨウ，チシマギキヨウ，ウサギギク，チヨウジギク，ミヤマオトコヨモギ，ヒトツバヨモギ，タカネヨモギ，イワインチン，タチアザミ，ナンブタカネアザミ，ミヤマアズマギク，ミヤマコウゾリナ，タカネニガナ，ミヤマウスユキソウ，カイタカラコウ，オタカラコウ，ミヤマキタアザミ，ミヤマアキノキリンソウ。

○ 日鮮産植物小記（佐方敏男）Toshio SAKATA: Notes on some plants of Japan and Korea.

1. *Cirsium chikushiense* Koidz. form. **albiflorum** Sakata, nov.

   Flores albi. Nom. Jap. Shirobana-nomaazami.

   Hab. Prov. Satsuma: in itinere ad. Mt. Isoma, Kaseda-chō, ubi cum typico mixte unum crescit (Oct. 26, 1950—T. Sak.).

2. *Oxalis corniculata* L. form. **plena** Sakata nov.

   Flores prllescenti pleni, sepalis petalisque angustioribus uterque 10, staminibus 5. Nom. Jap. Hoshizaki-katabami.

Hab. Prov. Satsuma; circa Banseichō (Jun. 20, 1948—T. Sak.).

3. *Parabenzoin trilobum* Nak. form. **integrum** Sakata, nov.

Folia integra vel subintegra. Nom. Jap. Maruba-shiromoji.

Hab. Hondo: Prov. Iwami, prope Shigaku pede Mt. Sambe-san (Aug. 11, 1949—T. Sak.).

4. *Rosa Luciae* Fr. et Sav. var. *Onoei* Momiyama form. **plena** Sakata, nov.

Flores pleni. Nom. Jap. Yae-nioiibara.

Hab. Prov. Satsuma: ad pedem orientalem Mt. Shirakame, Kaseda-chō (Mai. 23, 1948—T. Sak.).

5. *Gardenia jasminoides* Ellis var. *jasminoides* form. **globicarpa** Sakata, nov.

Bacca globosa fere non costata ca 1.2 cm diametro, calyce coronata, calysis laciniis verticalibus lineari-subulatis 1.5 cm longis. Pedicelli 1 cm longi. Folia oblonga vel late oblanceolata 6 cm longa 2 cm lata. Flores mini ignoti. Nom. Jap. Marumino-kuchinashi.

Hab. Prov. Satsuma: circa Akōgi prope Kasasa-chō (anno 1948—Kikuko Matsuo.)

6. *Tubocapsicum anomalum* Mak. form. **longicarpum** Sakata, nov.

Frucutus ellipsoideus. Folia angutiora. Nom. Jap. Nagamino-hadakahodzuki.

Hab. Prov. Satsuma: Mt. Chōyasan, Kaseda-chō (Aug. 30, 1948—T. Sak.).

7. *Swertia Tachiroi* Mak. form. **immaculata** Sakata, nov.

Petala intus immaculata. Nom. Jap. Hoshinashi-hetsukarindo.

Hab. Prov. Ōsumi: Mt. Hoyoshidake (Nov. 17, 1956—F. Nishimoto).

8. *Cephalanthera falcata* Lindl. form. **variegata** Sakata, nov.

Folia aureo-variegata. Nom. Jap. Suji-kinran.

Hab. Prov. Satsuma: Mt. Chōyasan, Kaseda-shi (Apr. 29, 1957—T. Sak.).

9. *Flagellarisaema thunbergii* Nak. var. **corniculatum** Sakata, nov.

Appendix spadicis parte incrassato superiore cornibus atropurpureis paucis instructa, cetera ut in typico. Nom. Jap. Kuchihige-urashimaso.

Hab. Prov. Satsuma: Mt. Chōyasan, Kaseda-shi (Apr. 29, 1957—T. Sak.).

10. *Sambucus chinensis* Lindl. form. **variegata** Sakata, nov.

Folio albo- vel aureo-variegata. Nom. Jap. Fuiri-sokudzu.

Hab. Prov. Satsuma: in itinere Bansei, Kaseda-shi (Jul. 15, 1957—T. Sak.).

11. *Plantago asiatica* L. var. *densiuscula* Pilger form. **heterostachya** Sakata, nov.

Planta caulescens. Caulis erectus, glaber, 15 cm altus, multi-scapiger, scapis

axillaribus, ad 10 cm longis, superioribus brevissimis. Folia radicalia rosulata, ovata, ad 10 cm longa, longe petiolata; caulina conformia minora laxe disposita, sed in summo congesta. Nom. Jap. Kukidachi-ōbako.

Hab. Prov. Satsuma: in herbidis Bansei, Kaseda-shi (Mai. 19, 1957—T. Sak.).

12. *Milletia japonica* A. Gray form. **alborosea** Sakata, nov.

Flores alborosei. Nom. Jap. Akebono-natsufuji.

Hab. Prov. Satsuma: circa Bansei, Kaseda-shi (Aug. 18, 1957—T. Sak.).

13. *Chirta primuloides* Ohwi form. **immaculata** Sakata, nov.

Corollae intus immaculatae. Nom. Jap. Funashi-iwagiri.

Hab. Prov. Satsuma: ad rupibus montis Isoma, Kaseda-chō (Mai. 5, 1951—T. Sak.).

14. *Farfugium japonicum* Kitam. form. **fissile** Sakata nov.

Corollae radii apice profunde trifidae. Nom. Jap. Hosozaki-tsuwabuki.

Hab. Prov. Satsuma: circa Kaseda-si (Dec. 14, 1956—T. Sak.).

15. *Stephanotis japonica* Mak. form. **elliptica** Sakata, nov.

Folia plerumque elliptica inferne attenuata basi haud cordata. Nom. Jap. Satsuma-shitakisō.

Hab. Prov. Satsuma: Mt. Iwato prope Makurazaki (Mai. 14, 1948—T. Sak.).

16. *Bupleurum euphorbioides* Nak. var. **alpestre** Sakata, nov.

A type differt caule humiliore, involucri involucellique foliolis latioribus apice acuminatis longe caudatis. Nom. Jap. Miyama-taigekisaiko.

Hab. Korea septentrionalis: in regione alpina Mt. Shajitsuhō (anno 1936—T. Sak.).

17. *Cirsium Maackii* Max. form **albiflorum** Sakata, stat. nov.

C. Maackii var. *albiflorum* Sakata in Journ. Kor. Loc. Pl. no. 1, 3 (1935).

Nom. Jap. Shirobana-karanoazami. Hab. Korea media.

18. *Monochoria vaginalis* Presl. var. *plantaginea* Solms-Laub. form. **albiflora** Sakata, comb. nov.

M. plantaginea form. *albiflora* Sakata in Suigen Nōgakkaihō (Dec. 1943).

Nom. Jap. Shirobana-konagi. Hab. Korea sept.

19. *Utricularia surea* Lour. form. **koreana** Sakata, comb. et stat. nov.

U. pilosa var. *koreana* Sakata in Journ. Chōsen. Nat. Hist. Soc. no. 20 (1935).

Nom. Jap. Korai-notanukimo. Hab. Korea media.

20. *Lathyrus Vaniotii* Lev. et Vnt. form. **ovatus** Sakata, stat. nov.
L. Vaniotii var. *ovatus* Sakata in Journ. Korean Loc. Pl. no. 1, 1 cum fig. (1935).
Nom. Jap. Hiroha-chosenyamaendō. Hab. Korea sept.

---

1. シロバナノマアザミ（新称）

ノマ（野間）アザミの白花品。鹿児島県加世田市西南の磯間山附近の路傍で 1950 年 10 月に発見採集した。

2. ホシザキカタバミ（新称）

所在に多い雑草カタバミの一新品。花は淡黄色，萼及び花弁の数は倍加し雄蕊数は半減しているほか常品と変りがない。前記加世田市万世の産。1948 年に採集した。

3. マルバシロモジ（新称）

シロモジの葉が分裂していない一品。1949 年夏岡本大二郎氏（現農林省中国農試験技官）の厚意により島根県三瓶山に採集時志学附近に発見採集した。

4. ヤエニオイイバラ（新称）

ニオイイバラの八重花品。花径は 3 cm 許りで常品より開花が 1 週間から 10 日位おくれる。加世田市白亀山中に 1948 年 5 月発見採集した。本種研究のため必要な標本を御恵送下さつた静岡大学農学部斉藤全生氏に深謝する。

5. マルミノクチナシ（新称）

クチナシの果実が小形球状で直径 1.2 cm 位，縦稜は不明瞭単に 9 主脈があるだけの異品。元加世田高校生徒松尾喜久子嬢が加世田市に近い赤生木で 1948 年に採集したもので未だ花を見る機会を得ない。

6. ナガミノハダカホオヅキ（新称）

楕円形果をつけるハダカホオヅキの一新品。加世田市長屋山の産。1948 年に採集。

7. ホシナシヘツカリンドウ（新称）

ヘツカリンドウの常品は平開した花弁の中央部に一個の黄緑腺体とその上方部に紫褐色の細点を密布するが 1956 年秋西元藤吉氏（現鹿児島県立川辺高校教諭）が大隅国高山町に近い甫与志岳で採られたものは全然細点がない一新品であるから上記の新名を附した。

8. スジキンラン（新称）

キンランの葉上黄色縦斑のある一品。前記長屋山頂上附近で 1957 年に採集した。

9. クチヒゲウラシマソウ（新称）

ナンゴクウラシマソウの一変種。肉穂花序附属鞭状物の基部膨大部（黄白色）と其先端暗紫色鞭状部との境の附近に暗紫色小角状突起数個が集つているのが著しい異点であ

る。前記長屋山中の産。1957 年に採集。

10.　フイリソクズ（新称）

ソクズの斑入葉の一品。1957 年前記万世の野外に発見し移植園観察を続けているが緑葉や斑入葉とりまぜて新葉が次々に開出している。

11.　クキダチオオバコ（新称）

オオバコに地上茎が 15 cm 位抽出してそれに数葉の葉を生じその葉腋にそれぞれ 1 本宛の穂状花序を出す異点。ヤグラオオバコやヤツマタオオバコなどとは余程趣を異にしているがこの性質の遺伝関係はまだ不明である。一応新名をつけて今後の研究に俟つこととする。同市万世の路傍に 1957 年 1 株を発見採集した。

12.　アケボノナツフジ（新称）

ナツフジの花弁が淡紅色に染つた品種。蕾の時ほどこの色は著しい。前記万世の産。1957 年に採集した.

13.　フナシイワギリ（新称）

花冠の内面に濃紫色斑のないイワギリソウの一品。上記磯間山の岩壁上で 1951 年に採集。

14.　ホソザキツワブキ（新称）

1 頭状花中にある 10 個内外の舌状花は悉く先端から 3 深裂するツワブキの異品。加世田市で 1956 年秋に採集した。

15.　サツマシタキソウ（新称）

花枝附近の葉は常品の如く心底とならず鋭又は鈍底となるシタキソウの一品種。薩摩半島南端の漁港枕崎市岩戸山の産。1948 年に採集。本種の研究に当り 1949 年夏鹿児島大学農学部腊葉室の他産のシタキソウ標本を見せて下さつた初島住彦博士にお礼を申し上げる。

16.　ミヤマタイゲキサイコ（新称）

北部朝鮮の高山遮日峰頂附近のタイゲキサイコは常品と異なり草丈低く花序の小苞及び苞葉は幅広く先端が著しく長く尾状に細まつているので一変種と見做したい。本変種の詳細な記載及原図原稿は他の原稿と共に 38 度線に近接の朔寧に於て不法なる保安署員にあえなくも没収されてしまつたことを附記しておこう。

17～20.　筆者が先に発表した朝鮮植物の変種又は品種の学名変更で，それ等はシロバナカラノアザミ，シロバナコナギ，コウライノタヌキモ及びヒロハチヨウセンヤマエンドウである。

本文を終るに当り，筆者は 20 数年来何くれと絶えず力づけて下さつた植木秀幹先生に衷心謝意を述べなければならない。（1957，9，25 記）

（鹿児島県加世田高等学校）